

# Alergeny Kočka

## Panel I ANITIA Feline IgE I

<b>Roztoči</b>
Dermatophagoides pteronyssinus Dermatophagoides farinae Acarus siro Tyrophagus putrescentiae
<b>Stromy</b>
Olše / Bříza Liska Javor / Platan Vrba / Topol Dub Borovice bělavá Akát Jasan ztepilý
<b>Rostliny a trávy</b>
Ambrozie peřenolistá Jitrocel Pelyněk černobýl Šťovík kyselý Psárka luční Bojínek luční Žito seté Žito pěstované
<b>Zvěř</b>
Zvířecí srst (kočka) Ověčí vln Mix peří
<b>Plísně</b>
Penicillium notatum Cladosporium herbarum Aspergillus fumigatus Candida albicans Alternaria alternata Malassezia pachydermatis
<b>Hmyz</b>
Blecha Šváb
<b>Maso</b>
Vepřové maso Hovězí maso Kachní maso Kuřecí maso Jehněčí maso Krůtí maso Jelení maso
<b>Potraviny</b>
Pšenice Kukuřice Rýže Hrách Sója Mrkev Brambor Batát Dýně Rajče Jablko Droždí (pivovarské) Vaječný bílek Vaječný žloutek Mléko Sýr (čedar / gouda) Arašíd
<b>Ryby</b>
Krab/Kreveta Treska Tuňák Losos Makrela

## Panel II ANITIA Feline IgE II

<b>Škůdci</b>
Domácí prach Coryphaenoides domesticus Blatta tropicalis (šváb)
<b>Rostliny</b>
Japonský chmel Srha laločnatá Rákos obecný Psineček výběžkatý Japonský cedr Kopretina bílá Pampeliška Ruský bodlák Zlatobýl Merlík bílý
<b>Hmyz</b>
Včelí jed Mravenec ohnivý Komár Kukla bource morušového
<b>Etc.</b>
CCD Latex Kůže (skot)
<b>Potraviny</b>
Lněné semínko $\alpha$ -laktalbumin $\beta$ -laktoglobulin Kasein Podmáslí Lepek Pivovarské kvasnice Králík Slávka/škeble Pstruh Sleď Sardinka Sardel Mořský okoun Ječmen Oves Pohanka Proso Čočka Kaštan jedlý Broskev Pomeranč Jahoda Borůvka Kiwi Meloun Mango Banán Hruška Ananas Švestka Vodní meloun Petržel Zelí Okurka Brokolice Květák Ředkvička Paprika Špenát